

Daivobet®

calcipotriol/Betamethasone Dipropionate



فرم و ترکیب فعال دارویی:

پماد ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ گرمی که هر گرم حاوی ۵۰ میکروگرم کلسیوتریول به شکل هیدرات و ۵ میلی گرم بتامتازون به شکل دی پروپیونات میباشد.

موارد مصرف:

درمان پسوریازیس ولگاریس

مقدار و نحوه مصرف:

روزانه ۱ بار به مدت ۴ هفته به موضع مالیده شود. میزان مصرف نباید از ۱۰۰ گرم در هفته تجاوز کند. تجربه ای در زمینه مصرف در کودکان وجود ندارد.

موارد منع مصرف:

حساسیت شناخته شده به کلسیوتریول و یا دیگر اجزای تشکیل دهنده دارو، اختلال شناخته شده در متابولیسم کلسیم (کلسیوتریول)، ضایعات ویروسی و عفونتهای قارچی و باکتریایی پوست (کورتیکواستروئیدها).

موارد احتیاط:

پماد را در ناحیه صورت استفاده نکنید. بعد از هر بار مصرف دستها را بشوئید تا از برخورد دارو با سایر مناطق اجتناب شود. در صورت تجاوز از دوز مجاز ممکن است هیپرکلسمی رخ دهد که در صورت قطع درمان به سرعت برگشت پذیر است. سرکوب آدرنوکورتیکال یا تشدید دیابت ملیتوس ممکن است در اثر جذب سیستمیک استروئید موضعی رخ دهد. از مصرف کرم روی نواحی وسیعی از پوست، نواحی تحت پوشش و چینهای پوستی اجتناب شود. در بیماریهای شدید کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.

تداخل دارویی:

شناخته نشده است.

بارداری و شیردهی

بی ضرری دارو در بارداری و شیردهی هنوز به اثبات نرسیده است، لذا از مصرف در دوران بارداری و شیردهی پرهیز شود، مگر پزشک مصرف دارو را تجویز و تایید کند.

تأثیر بر رانندگی و کاربرد ماشینها:

تأثیری نداشته و یا بسیار ناچیز است.

عوارض جانبی:


شایعترین عارضه جانبی خارش می باشد. سایر عوارض موضعی گزارش شده ناشی از کلسیوتریول مثل سوزش موضعی گذرا، درماتیت، قرمزی و تشدید پسوریازیس ممکن است دیده شوند. آتروفی پوست، تلاتزکتازی و استریا در بررسی های بالینی گزارش نشده است اما در مصرف دراز مدت ممکن است دیده شوند. فولیکولیت، پرمونی، درماتیت پری اورال، درماتیت تماسی و دیپگمانتاسیون، هر چند نادر، اما ممکن است رخ دهند.

مصرف بیش از میزان تجویز شده:

ممکن است سبب هیپرکلسمی بشود که باید پس از قطع درمان سرعت پائین آورده شود. سرکوب محور آدرنال/هیپوفیز و در نتیجه نارسانای ثانویه آدرنال در مصرف دراز مدت و زیاد دارو ممکن است رخ دهد که با قطع دارو برگشت پذیر است. در این موارد درمان علامتی توصیه می شود. در موارد مسمومیت مزمن، درمان کورتیکواستروئید باید به تدریج قطع گردد.

شرایط نگهداری:

زیر ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



Before treatment



After 4 weeks treatment with Daivobet twice daily

