

# Daivonex® (Calcipotriol)



## فرم و ترکیب فعال دارویی:

پماد و کرم: تیوب های ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ گرمی که هر گرم حاوی ۵۰ میکروگرم کلسیوتریول میباشد.

محلول: بطری ۶۰ و ۱۲۰ میلی لیتری که هر میلی لیتر حاوی ۵۰ میکروگرم کلسیوتریول میباشد.

## موارد مصرف:

پماد-کرم: درمان پسوریازیس و لنگاریس

محلول: درمان موضعی اسکالپ پسوریازیس خفیف تا متوسط

## مقدار و نحوه مصرف:

### پماد:

بزرگسالان: روزانه ۱ تا ۲ بار به موضع مالیده شود. غا لباً روزی دو بار ارجحیت دارد. پس از پاسخ درمانی به روزی یکبار کاهش داده می شود. میزان مصرف نباید از هفته ای ۱۰۰ گرم تجاوز کند. وقتی که پماد، کرم و محلول بطور همزمان مصرف می شوند، میزان کلسیوتریول نباید از ۵ میلی گرم در هفته تجاوز کند.

کودکان: بالای ۱۲ سال: روزانه دو بار موضعی و در هفته از ۷۵ گرم تجاوز نکند.

۶ تا ۱۲ سال: روزانه دو بار موضعی و در هفته از ۵۰ گرم تجاوز نکند.

زیر ۶ سال: تجربه کافی در این زمینه وجود ندارد.

### کرم:

بزرگسالان: روزانه ۱ تا ۲ بار به موضع مالیده شود. غا لباً روزی دو بار ارجحیت دارد. پس از پاسخ درمانی به روزی یکبار کاهش داده می شود. میزان مصرف نباید از هفته ای ۱۰۰ گرم تجاوز کند. وقتی که پماد، کرم و محلول بطور همزمان مصرف می شوند، میزان کلسیوتریول نباید از ۵ میلی گرم در هفته تجاوز کند.

کودکان: تجربه ای در این زمینه وجود ندارد.

## محلول:

بزرگسالان: محلول را روزانه دو بار به موضع بمالید. میزان مصرف نباید از هفته ای ۶۰ میلی لیتر تجاوز کند. وقتی که پماد، کرم و محلول بطور همزمان مصرف می شوند، میزان کلسیوتریول نباید از ۵ میلی گرم در هفته تجاوز کند.

کودکان: تجربه ای در این زمینه وجود ندارد.

## موارد منع مصرف:

حساسیت شناخته شده به کلسیوتریول و یا دیگر اجزای تشکیل دهنده دارو.

اختلال شناخته شده در متابولیسم کلسیم. بیماری شدید کبد و کلیه.

## موارد احتیاط:

پماد را در ناحیه صورت استفاده نکنید. بعد از هر بار مصرف دستها را بشوئید تا از برخورد دارو با صورت اجتناب شود. در صورت تجاوز از دوز مجاز ممکن است هیپر کلسمی رخ دهد که در صورت قطع درمان به سرعت برگشت پذیر است.

## تداخل دارویی:

شناخته نشده است.

## بارداری و شیردهی

بی ضرری دارو در بارداری و شیردهی هنوز به اثبات نرسیده است. اگر چه تجارب مصرف حیوانی اثرات تراتوژنیک را نشان نداده است اما از مصرف در دوران بارداری و شیردهی پرهیز شود، مگر درمان جایگزین کم خطرتری امکان نداشته باشد. ترشح در شیر مطالعه نشده است.

## عوارض جانبی:

شایعترین عارضه جانبی سوزش موضعی و گذرا می باشد. اریتم، خارش، درماتیت، تشدید پسوریازیس و هیپرپیگمانتاسیون هم ممکن است دیده شوند. اریتم و خارش شایع و تشدید پسوریازیس نادر است. هیپرپیگمانتاسیون، هیپرکلسیوری و هیپرکلسمی بسیار نادر هستند.

## شرایط نگهداری:

زیر ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

