

Fucidin®

Fusidic Acid/Sodium Fusidate



فرم و ترکیب فعال دارویی:

پماد فوزیدین: تیوب ۱۵ گرمی هر گرم حاوی ۲۰ میلی گرم سدیم فوزیدات (۲٪) در پایه پمادی می باشد.

کرم فوزیدین: تیوب ۱۵ گرمی هر گرم حاوی ۲۰ میلی گرم فوزیدیک اسید (۲٪) در یک پایه کرمی می باشد.

گاز فوزیدین: گاز آغشته به پماد فوزیدین

موارد مصرف:

درمان عفونتهای پوستی ایجاد شده توسط استافیلوکوک، استرپتوکوک و یا سایر ارگانسمهای حساس به فوزیدین

نحوه مصرف:

پماد، کرم و ژل: روزانه ۲ تا ۳ بار برای مدت یک هفته با یا بدون پانسمان پوششی به موضع مالیده شود.

گاز فوزیدین: گاز فوزیدین را بطور آسپتیک روی موضع گذاشته و روی آنرا با پانسمان بپوشانید. روزانه یکبار و بعضا هر ۲ یا ۳ روز یکبار حسب نیاز پانسمان را تعویض کنید. در مواقعی که ترشح انزوداتیو زیاد است، جهت جلوگیری از چسیدن، با دولایه گاز فوزیدین پانسمان کنید.

موارد احتیاط:

پماد و گاز فوزیدین را در نزدیکی چشم بکار نبرید زیرا بدلیل داشتن نمک سدیم ممکن است سبب تحریک چشم و کوزونکتیویت شود.

عوارض جانبی:


فوزیدین بخوبی تحمل می شود و گزارش عوارض جانبی بسیار پائین است. در صورت بروز عوارض با پزشک خود تماس بگیرید.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق، ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

Fucidin®
fusidic acid/
sodium fusidate

Erythromycin Tetracycline Neomycin Mupirocin



Wound infection

Before treatment



Impetigo

Before treatment



After 10 days
Fucidin
treatment



After 7 days
Fucidin
treatment

